



Celleforandringer i livmoderhalsen

013



Celleforandringer i livmoderhalsen

Celleforandringer er ikke kræft. Celleforandringerne er forstadier, der kan udvikle sig til livmoderhalskræft. En del celleforandringer forsvinder af sig selv, mens andre kræver behandling. Celleforandringer er ofte forårsaget af virus (HPV) og er ikke arvelige. Behandlingen er relativt enkel, og stort set alle kvinder bliver helbredt.

Yderligere undersøgelser

Hvis du har fået påvist celleforandringer ved et celledrab hos din egen læge, vil du i første omgang få foretaget en kikkertundersøgelse af livmoderhalsen (kolposkopi) kombineret med små vævsprøver (biopsier) og et lille skrab (cervixabrasio) fra livmoderhalsen. Disse undersøgelser foretages ambulant og kræver ikke bedøvelse.

Vævet bliver mikroskopert og inddeles i grader. Man taler om:

- Lette celleforandringer
- Moderate celleforandringer
- Svære celleforandringer

Behandling af celleforandringer

Hvis der er tale om lette eller moderate forandringer, vil det i første omgang være tilstrækkeligt med kontrol efter seks måneder. Ved svære celleforandringer vil du blive tilbudt en kegleoperation med henblik på endelig diagnostik og behandling. Indgrebet foregår på operationsgangen i lokal- eller helbedøvelse. Der udskæres et lille kegleformet vævsstykke fra livmoderhalsen med inddragende celleforandringer.

Efter indgrebet

Du skal tage den med ro et par dage og undgå løb og cykling. Har du tungt arbejde tilråder vi sygemelding på tre til fire dage. Der vil være sparsom blødning og udflåd to til tre uger efter indgrebet, og i den periode bør du undgå samleje, svømmebad og karbad.

Hvis du får kraftige smerter eller blødninger og eventuelt feber efter operationen, bør du søge læge.

Indgrebet har ingen indflydelse på det seksuelle samliv eller dine muligheder for at blive gravid og gennemføre en graviditet

Kontrol

Ca. en til to uger efter indgrebet kan du forvente svar på den mikroskopiske undersøgelse af det fjernede væv. Den videre kontrol afhænger af, om der er sundt væv hele vejen rundt om forandringen.

Hvis forandringerne er fjernet i sundt væv, skal du kontrolleres med celleprøve hos din egen læge efter seks måneder, herefter årligt i to år og derefter hvert tredje år.

Hvis der er tvivl om, hvorvidt keglen er fjernet i sundt væv, skal du kontrolleres hos gynækologen første gang efter cirka seks måneder. Du bør tale med din egen læge om HPV-vaccination.

Selv om forandringerne når kanten, er det sjældent nødvendigt med yderligere behandling.

Yderligere information:

Kræftens Bekæmpelses hjemmeside omkring celleforandringer: www.cancer.dk
www.netdoktor.dk

www.sundhed.dk