



Prostatabiopsi

072



Prostatabiopsi

Hvornår foretages biopsi?

- Når PSA (prostatablodprøven) i blodet er forhøjet
- Når lægen kan føle forandringer ved blærehalskirtlen (prostata)

Herefter undersøges biopsi for kræftsygdom i prostata.

Forberedelse:

For at forebygge infektioner modtager man umiddelbart inden prøvetagningen en tablet Ciproxin på 500mg. Derudover får man også en tablet til indtagelse seks timer efter biopsien.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Du bliver lagt på et leje på venstre side med ryggen til lægen. Lægen fører en ultralydsscanner op i endetarmen og via den tages 6-10 vævsprøver. Det tager cirka 15-20 minutter og kræver ikke bedøvelse.

Der er ofte lettere, forbigående smerter forbundet med undersøgelsen

Efter undersøgelsen

- Der vil forekomme blod i afføringen samt blod i urinen ved de første toiletbesøg
- I forbindelse med sædafgang kan der også forekomme blod.

Hvis du får kropstemperatur over 38,5 grader celsius og har smerter efterfølgende, skal du kontakte PrivatHospitalet Danmark på 39 64 19 49 eller egen læge. Du får svar på prøverne inden for otte til ti dage efter undersøgelsen.

